

Inconnu Masson 3



\*0MTP1699\*



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1699

Vass2R06s546-550

*0-1699  
2 R 6 2546-550  
Inconnu Masson 3*

AmpFH

0Mtp1699 Inconnu Masson 3

*GG*


*faible 200 g*

Vass2R06s546-550
















G-6

**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009 3074      Observateur :  
Code cépage :      Code introduction : 0Mtp1699  
Nom introduction : Inconnu Masson 3  
Emplacement : **Vass2R06s546-550**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	flbe			—	
2	flbe			—	
3	4 flbe	8/3	12/3	0	
4	flbe			—	
5	flbe			—	
Moyenne			12/3 -5		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)



**Formulaire de description 2 / 8**  
(stade floraison)

Année : 2009 21/06/2016

Code introduction : 0Mtp1699

Nom introduction : Inconnu Masson 3

Observateur : TF en 2009

C. Marchal

Emplacement : Vass2R06s546-550

*Bourgeonnement*

oiv 001 **forme** : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente 1 - en liseré 2 - partout 3

oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

*Jeunes feuilles*

oiv 051 **couleur face supérieure** (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

*Vassal :*

*Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)*

**Profil** : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

**Densité poils couchés face inf.** : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

**Densité poils dressés face inf.** : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

**Densité poils couchés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Densité poils dressés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Couleur face sup.** : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée : .....)

*Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)*

**Profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

**Densité poils couchés face inf.** : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

**Densité poils dressés face inf.** : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

**Densité poils couchés nervures face inf.** : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.

**Densité poils dressés nervures face inf.** : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

**Densité poils couchés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Densité poils dressés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Couleur face sup.** : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.



**Formulaire de description 3/8**  
(stade floraison)

Année : ~~2009~~ 21/06/2016  
Code introduction : 0Mtp1699  
Nom introduction : **Inconnu Masson 3**

Observateur : C. Mauchal

Emplacement : **Vass2R06s546-550**

*Rameau herbacé*

oiv 006 **port** : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9.

oiv 351 **vigueur rameaux** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 **couleur face dorsale entrenoeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 **couleur face dorsale noeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 **couleur face ventrale entrenoeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 **couleur face ventrale noeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 **densité poils couchés entrenoeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 **densité poils dressés entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 013 **densité poils couchés noeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 **densité poils dressés noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 015 **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) 1 - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2.

oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

*Inflorescence*

*très tard*

oiv 151 **sexe de la fleur** : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 **niveau insertion 1° inflorescence** : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4.

oiv 155 **inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base** : absence 1 - présence 9.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

*Vassal :*

**Surface du rameau herbacé** : unie 1 - côtelée 2

000-10 **Villosité spéciale du rameau herbacé** : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 - aucune 3.

000-21 **Couleur des vrilles** : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4.

**Bouton floral** : petit 1 - moyen 2 - gros 3.



# Formulaire de description 4 / 8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

P1

Année : 2009 2010

Observateur : TD

Code cépage :

Code introduction : 0Mtp1699

Lacombe → 1<sup>ère</sup> 2009

Nom introduction : Inconnu Masson 3

Emplacement : Vass2R06s546-550

## LIMBE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	<u>Petite</u>	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	<u>4-Orbicul.</u>	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	<u>2-Trois</u>	3-Cinq	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	<u>Vert moyen</u>	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	<u>1-Nulle</u>	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- Après 1 <sup>ère</sup> bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	1- Nulle	<u>2- Point pétiolaire</u>	3- Jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- Après 1 <sup>ère</sup> bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	<u>1-Plan</u>	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	Absente				<u>Présente</u>
Oiv 075	Cloûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

## PETIOLE

Oiv 090	Densité poils couchés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	<u>Plus court</u>	Égal	Plus long	Beaucoup plus long

## SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	<u>2-ouvert</u>	3- peu ouvert	4- fermé	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
Oiv 81-1	Dent sur le bord		<u>1- Absence</u>	2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents			
Oiv 81-2	Base dégarnie		<u>1- Absence</u>	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		

## SINUS LATéraux SUPERIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	<u>2- ouverts</u>	3- fermés	4- lobes très chevauchants	<u>peu profonds</u>	
Oiv 83-1	Forme		<u>1- en U</u>	2- en accolade	3- en V		
Oiv 83-2	Dent		<u>1- Absence</u>	2- Présence fréquente			

## DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	1- côtés concaves	<u>2- côtés rectilignes</u>	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	Petites	<u>Moyennes</u>	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	<u>Moyennes</u>	Longues	Très longues

## AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)
---------	--	--------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------

pas de grappe 2010



<b>Formulaire description 5 / 8</b> (maturité physiologique)		Emplacement <i>2 R6. 546 - 550 -</i>
Nom variété / introduction <i>Inconnue Marsson 3</i>		Remarques <i>PdG 2010</i>
Observateur - Date <i>C. Marchal 18/8/17</i>	Code var / intro <i>oMtp 1699</i>	

GRAPPE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
202 = (32)	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : <i>14</i>	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	<u>moyenne (14-18 cm)</u>	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
203 = (32)	Largeur Valeur absolue (en cm) : <i>7</i>	très étroite (<5 cm)	<u>étroite (5-10 cm)</u>	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
204 = 33	Compacité	très lâche	lâche	<u>moyenne</u>	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	<u>moyen</u>	fort	très fort
206 = 34	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : <i>4</i>	très court (<3 cm)	<u>court (3-5 cm)</u>	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
207	Lignification du pédoncule	base seule.		<u>jusqu. moitié</u>	+ de moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	<u>2-non color</u>			
208	Forme de la grappe	<u>1-cylindrique</u>	2-conique	3-entonnoir		
209	Nombre d'ailes de la grappe principale	<u>1-absentes</u>	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE														
220 = (35)	Longueur Valeur absolue (en mm) : <u>10</u>				très courte ( $<8\text{mm}$ )		courte (8-14mm)		moyenne (14-20mm)		longue (20-26mm)		très longue ( $>26\text{mm}$ )	
221 = (35)	Largeur Valeur absolue (en mm) : <u>10</u>				très étroite ( $<8\text{mm}$ )		étroite (8-14mm)		moyenne (14-20mm)		large (20-26mm)		très large ( $>26\text{mm}$ )	
222	Uniformité de la grosseur				1-non unif.		3-uniforme							
223 = 36	Forme	1- sphérique e aplatie	2- sphérique	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindrique	6- tronconique	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme			
225 = 37	Couleur épiderme + ocvv		1- vert jaune vert	2- rose jaune	3- rouge jaune-rosé	4- gris	5- rouge foncé violet				6- bleu noir			
226	Uniformité couleur épiderme				1- non uniforme		3- uniforme							
227	Pruine				nul ou t. fb.		faible		moyenne		forte		très forte	
228 = 39	Épaisseur pellicule				très mince		mince		moyenne		épaisse		très épaisse	
229	Ombilic (apparence)				1- peu apparent		2- apparent							
000-18	Région ombilicale (dépression)				1- déprimée		2- non déprimée							
230	Coloration de la pulpe				1-non colorée		2- colorée							
231 = 40	Intensité pigmentation anthocian. pulpe				nul ou t. fb.		faible		moyenne		forte		très forte	
232	Succulence de la pulpe				1- peu juteuse		2- moyen. juteuse		3- très jut.					
233	Rendement en jus (ml / 100g baies)						faible		moyen		élevé			
235 = 41	Fermeté de la pulpe				1- molle		2- légèrement. ferme		3-très ferme					
236 = 42	Saveur				1-aucune		2- muscatée		3- foxée		4- herbacée		5-autre	
238	Longueur pédicelle				très court ( $<4\text{mm}$ )		court (4-8mm)		moyen (8-12mm)		long (12-16mm)		très long ( $>16\text{mm}$ )	
240 = 38	Séparation du pédicelle				1- très facile		2- facile		3- difficile					

PEPINS					
241 = 43	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)	<u>3-complète</u>
242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : .....	très courts	<u>courts</u>	moyens	longs
243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : .....	très faible (<10mg)	faible (25mg)	moyen (40mg)	très élevé (>65mg)
244	Cannelures transversales face dorsale pépins	<u>1-absentes</u>	2-présentes		

INRA Vassal	Virus ENR	Mildiou	Esca	Chlorose
Codes OIV 2009 (= OCVV 2013)	Virus CN	Oïdium	Eutypiose	Carence Mg
Codes 000-internes	Autre	Botrytis	Exciosiose	Autre



**Formulaire de description 6 / 8**  
(après chute des feuilles)

Année : 2009

Code cépage :

Nom introduction : Inconnu Masson 3

Code introduction : 0Mtp1699

Observateur :

Emplacement : Vass2R06s546-550

*Sarment*

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 351 **vigueur** \* : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 20 mm

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 9 mm

*Suppléments pour Porte-greffe*

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

*Vassal :*

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

**Pruine sur sarment** : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

\* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »